



INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA



Rua das Laranjeiras, 374 - Rio de Janeiro



INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA

NEM TODA INFECÇÃO DE GARGANTA
É FEBRE REUMÁTICA, PORÉM TODA
FEBRE REUMÁTICA É CAUSADA POR
UMA INFECÇÃO DE GARGANTA



Telefone: (21) 3826-1108
febreumatica@inc.saude.gov.br
prefere@gmail.com

✍ O que é febre reumática?

R: É uma inflamação que pode envolver as articulações, o coração e o cérebro sempre após uma infecção de garganta mal curada.

✍ Como ela começa?

R: Em geral com febre e dores nas juntas cerca de 2 semanas após uma infecção de garganta não tratada ou mal tratada. Por isso é necessário que se procure um médico para fazer uma avaliação adequada.

✍ Qualquer dor de garganta pode causar febre reumática?

R: Não. Somente as amigdalites causadas por uma bactéria chamada estreptococo hemolítico grupo A.

✍ Como saber se a infecção de garganta é por estreptococo?

R: Em geral são amigdalites acompanhadas por febre alta, dor de garganta muito forte, placa de pus nas amígdalas e caroços no pescoço inchados e doloridos.

✍ Como tratar corretamente a infecção por estreptococo?

R: O tratamento precisa ser feito com antibióticos, o mais indicado é a penicilina benzatina que é feito em forma de injeção em dose única ou penicilina oral de acordo com orientação do seu médico.

✍ Eu posso ter febre reumática?

R: Sim. A febre reumática pode atingir qualquer pessoa, porém é mais comum em crianças e adolescentes na idade entre 5 a 15 anos.

✍ Quais os sintomas da febre reumática?

R: Febre, dores e sinais de inflamação nas juntas, principalmente nos joelhos, cotovelos, tornozelos e etc. Muitas vezes a criança não consegue andar, por causa da dor. Quando ataca o coração em geral manifesta-se com cansaço, falta de ar e sensação de coração disparado.

✍ Isto é grave?

R: Sim, a sua gravidade está relacionada ao envolvimento do coração, que é um órgão

vital, podendo deixar seqüela para o resto da vida.

✍ Como é feito o tratamento da febre reumática?

R: Quando diagnosticada, é feito através da administração da penicilina benzatina intramuscular no intervalo de 21/21 dias, de acordo com critérios médicos e uso de anti-inflamatório.

✍ Pode interromper o tratamento?

R: NÃO, o tratamento não pode ser interrompido. Se você interromper ocasionará danos irreversíveis ao seu coração.

✍ E quando não tratada?

R: A inflamação pode destruir as válvulas do coração, podendo ser necessário a cirurgia cardíaca e tratamento medicamentoso para o resto da vida.

✍ Previna a Febre Reumática

Tratando as amigdalites e seguindo corretamente a orientação do seu médico.