

برنامج مكافحة روماتزم القلب

وزارة الصحة الاتحادية

إدارة الرعاية الصحية الأساسية

نموذج (2) لمنسوبي الرعاية الصحية الأولية
(المساعد الطبي و المعاون الصحي)

علاج التهاب الحلق البكتيري و الحمى الروماتزمية

الرسائل الأساسية:

1. التهاب الحلق البكتيري يؤدي إلى الحمى الروماتزمية
2. الحمى الروماتزمية مرض خطير سيؤدي إلى روماتزم القلب الذي يدمر صمامات القلب و لا يمكن علاجه

التهاب الحلق البكتيري

الوقاية الأولية تمنع

الحمى الروماتزمية

الوقاية الثانوية تمنع

روماتزم القلب (لا يمكن علاجه)

التهاب الحلق البكتيري

ألم الحلق الحاد في عمر 4 سنوات الى 18 سنة

لا توجد نزله (كحة , جريان الأنف)

إعط

بعد اختبار الحساسية (ملحق) { **حقنة (واحدة)** البنسلين طويل الأجل :
600000 وحدة: أقل من 7 سنوات
1200000 وحدة: أكثر من 7 سنوات

الحمى الروماتزمية

يحول المريض للطبيب فوراً

ورم بالمفاصل الكبيره
ألم حاد بالمفاصل الكبيره
ضربات قلب سريعه
ضيق التنفس

مريض تم تشخيص الحمى الروماتزمية من قبل الطبيب:


يجب متابعة حقنة البنسلين طويل الأجل (نفس الجرعة أعلاه)

كل 21 يوم

يجب التأكد من عدم اهمال المريض لحقنة البنسلين كل 21 يوم

كيفية حقن البنسلين طويل الأجل:

اسأل المريض: هل تعاني من حساسية البنسلين؟



اختبار سطحي (فقط للمريض الذي يقول بأن عنده حساسية):

يحل الفتيل في 10 س س

يأخذ خط واحد

يخفف ب 10 س س ماء مقطر

يخدش الجلد بكمية 2 خط

الموجب: ظهور احمرار و حكة

اختبار عميق

يجب إجراؤه قبل كل حقنة

يحل الفتيل في 10 س س

يأخذ 2 خط

يحقن تحت الجلد حتى تتكون بقعه مساحتها 2-3 ملي متر

توضع علامة بالقلم حول منطقة الحقنة

ينتظر 20 دقيقة

الموجب: وجود بقعة مرتفعة مساحتها 5 ملي متر أو أكثر

لا تعطي الحقنة ابدا في حالة الاختبار الموجب

عند ظهور هذه الأعراض:

حكة شديده بالجلد : اعطي حقنة (انتي هستامين) - استدع الطبيب

هبوط بالجسم أو ضيق بالتنفس: اعطي حقنة ادرينالين- استدع الطبيب

في حالة حساسية البنسلين:

للأطفال أقل من 7 سنوات:

ارثرومايسين : 250 ملجم بالفم صباح و مساء لمدة 10 أيام

للأطفال أكثر من 7 سنوات:

ارثرومايسين : 250 ملجم بالفم صباح و مساء لمدة 10 أيام

كيف نعطي الحقنة:

- استعمل إبرة جديدة و احقن في عضلة الالية بعمق . إسحب أولاً
لتتجنب الوريد ثم أفرغ الدواء

